

Fachärzte für Mikrobiologie, Virologie, Infektionsepidemiologie und Laboratoriumsmedizin

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin Bernhard-Nocht-Straße 74 20359 Hamburg Kontakt

E-Mail:

Internet:

Probenannahme: Mo - Fr 8⁰⁰ - 14⁰⁰ Uhr

+49 40 285380 453

Laborärztliche Beratung: Mo-Fr 9⁰⁰ - 12⁰⁰, 14⁰⁰ - 16³⁰ Uhr


+49 40 285380 211

labordiagnostik@bnitm.de www.bnitm.de/labordiagnostik

Diagnostischer Untersuchungsauftrag Leistungsabrechnung gemäß EBM

Einsender	Klinische Angaben					
Adresse:	Fragestellung:	□ Akute Erkı	rankung	□ Verlaufskontrolle		
	☐ Chronisch ☐ Blutspender					
	Verdacht auf / Andere Fragestellung:					
Datum:	Vorbefunde:	□ Malaria	□ Dengu	e □ Echinokokkose		
Name, Telefonnummer des behandelnden Arztes:	□ Andere:					
	Demis-Meldung:		gs-ID anbei	□ Folgt □ Nein		
□ Rechnung an / □ Befundkopie an:	Hauptsymptome	und Sympto	mbeginn:			
Bericht per □ Fax-Nr:	1					
□ Post						
Der Auftraggeber garantiert die Vertraulichkeit der Faxübermittlung.	Auslandsaufenthalte (Länder, Dauer): Medikation/Prophylaxe:					
Patient	□ Europa:					
Name:	□ Amerika:					
	□ Asien:					
Geschlecht: männlich weiblich divers	□ Australien:					
Geburtsdatum:	□ Andere:					
Adresse:	Weitere Informationen / potenzielle Expositionen:					
	□ Tierkontakt:					
	□ Beruf:					
Eingesandtes Material (+ Anzahl und ggf. Lokalisation):	□ Freizeit					
□ Serum □ EDTA-Plasma	□ Sonstiges:					
□ Liquor □ EDTA-Vollblut						
□ Stuhl □ EDTA-Knochenmark						
□ Urin	Grunderkrankun	_	Impfungen:			
<u>Lokalisation:</u>	□ M. Waldenströ	m	□ Gelbfieber			
□ Gewebe/Biopsie	☐ Immunsuppres	ssion	□ Frühsomm	er-Meningoenzephalitis		
□ Abstrich	□ Immunglobulir	ngaben	□ Japanische	Enzephalitis		
□ Anderes:	□ Plasmapherese □ Denguefieber					
Entnahmedatum:	□ Sonstige:		□ Weitere:			
Entnahmeuhrzeit:						
ut t Bir I I of I to I t		/!		Ç.		

Hinweise: Bitte beachten Sie unser Leistungsverzeichnis: www.bnitm.de/labordiagnostik/leistungen/untersuchungsauftraege Beim Probenversand bitte die Geschäftsbedingungen der Deutschen Post AG und anderer Kurierdienste beachten. Bei Unterauftragsvergabe behält sich das BNITM vor, in dringenden Fällen den behandelnden Arzt direkt zu kontaktieren. Wir führen keine Untersuchungen gemäß § 20b AMG durch.



IGeL grau hinterlegt – Einwilligung des Patienten erforderlich

Bakterien	Eulaua milaum m	Antikärnornochusia			PCR	
Bakterien	Erkrankung	Antikörpernachweis				
Bacillus anthracis	Milzbrand (Anthrax)				□ EDTA-Blut <i>IGeL</i> □ Gewebe <i>IGeL</i>	
					☐ Sputum <i>IGeL</i>	
		□ lgM			□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
Bartonella henselae	Katzenkratzkrankheit	□ IgG	IIFT	Serum	□ Gewebe (LK) <i>IGeL</i>	
<i>Borrelia recurrentis</i> u.a. Rückfallfieber-Borrelien	Rückfallfieber				□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
	Brucellose	□ lgM			□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
Brucella spp.	(Morbus Bang)	□ IgG	EIT	Serum	□ Abszess <i>IGeL</i>	
	,	-			☐ Gewebe <i>IGeL</i> ☐ EDTA-Blut <i>IGeL</i> ☐	
Burkholderia pseudomallei	Melioidose				☐ Abszess <i>IGeL</i>	
	(Pseudorotz)				☐ Sputum <i>IGeL</i>	
		Screening			-1	
	Q-Fieber	□ Phase II-IgG		Serum	□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
Coxiella burnetii		Anschlussdiagnostik	IIFT		☐ Gewebe (Herzklappe)	
		□ Phase II-IgG/IgM			□ Sputum <i>IGeL</i>	
		☐ Phase I-IgG/IgM			a spatam roce	
Francisella tularensis	Tularämie	□ IgGAM	EIT	Serum	☐ Gewebe (LK, Haut) <i>IGeL</i>	
Trancischa talarensis	(Hasenpest)			Jeruin	` ' '	
Leptospira spp.	Leptospirose	□ IgM	EIT	Serum	□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
		□ lgG			□ Urin <i>IGeL</i>	
Mycobacterium leprae	Lepra	□ lgM	EIT	Serum	□ Haut <i>IGeL</i>	
Mycobacterium ulcerans	Buruli-Ulkus				□ Haut <i>IGeL</i>	
Orientia tsutsugamushi	Tsutsugamushi-Fieber	□ lgM	IIFT	Serum	□ Eschar/Haut <i>IGeL</i>	
	(Scrub typhus)	□ lgG			□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
Rickettsia africae	Afrikanisches Zeckenbissfieber	□ IgM	IIFT	Serum	□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
		□ IgG			□ Eschar/Haut <i>IGeL</i>	
Rickettsia conorii	Mittelmeer-Zeckenbissfieber	□ IgM	IIFT	Serum	□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
		□ lgG □ lgM			□ Eschar/Haut <i>IGeL</i>	
Rickettsia prowazekii	Epidemisches Fleckfieber	□ IgG	IIFT	Serum	□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
Rickettsia typhi	Murines Fleckfieber	□ IgM				
		□ IgG	IIFT	Serum	□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
Rickettsia rickettsii	Rocky Mountain		IIFT	Serum	□ EDTA-Blut /C-/	
	Spotted Fever	□ IgGAM			□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
Yersinia pestis	Pest				□ EDTA-Blut <i>IGeL</i>	
					☐ Gewebe (LK) <i>IGeL</i>	
Himmoiro			A h lett	raungor:	□ Sputum <i>IGeL</i>	
Hinweise: Biopsie/Gewebe In Röhrchen mit wenig NaCl 0,9% o. formalinfixiert (geringere Sensitivität). Analabklatschpräparat Klebefolie, nur eine Seite des Objektträgers bekleben! Serum 5-10 ml.			Abku IIFT	Abkürzungen: IIFT Indirekter Immunfluoreszenztest		
			EIT	,	mmuntest	
Knochenmark Für PCR in EDTA	Α.		IgGA IHA		globuline IgG, IgA, IgM te Hämagglutination	
IGEL (grau hinterlegt) Für gesetzlich versicherte Patienten nur als IGEL-Leistung (Sonderpreis auf Anfrage). IB Immunoblot						